

**ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ**

**ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ  
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ**

**ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ**

**ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021**

**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)**

**ΘΕΜΑ Α**

**A1.** Έστω μια συνάρτηση  $f$  ορισμένη σε ένα διάστημα  $\Delta$ .

Αν

- Η  $f$  είναι συνεχής στο  $\Delta$  και
- $f'(x) = 0$  για κάθε  $x$  εσωτερικό σημείο του  $\Delta$ ,

να αποδείξετε ότι η  $f$  είναι σταθερή σε όλο το διάστημα  $\Delta$ .

**Μονάδες 7**

**A2.** Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση  $f$  είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα  $[\alpha, \beta]$ ;

**Μονάδες 4**

**A3.** Να διατυπώσετε το θεώρημα Rolle.

**Μονάδες 4**

**A4.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

**α)** Αν  $f, g$  είναι δύο οποιεσδήποτε συναρτήσεις με πεδία ορισμού  $A$  και  $B$  αντίστοιχα, τότε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης  $\frac{f}{g}$  είναι το  $A \cap B$ .

**β)** Έστω μια συνάρτηση  $f$  ορισμένη σε ένα διάστημα  $\Delta$  και  $x_0$  ένα εσωτερικό σημείο του  $\Delta$ . Αν η  $f$  παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο  $x_0$  και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, τότε  $f'(x_0) = 0$ .

**γ)** Αν μια συνάρτηση  $f$ , η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα  $(\alpha, \beta)$ , παρουσιάζει στο σημείο  $x_0 \in (\alpha, \beta)$  καμπή, τότε  $f''(x_0) = 0$ .

**δ)** Για οποιαδήποτε συνάρτηση  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , με  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$ , ισχύει ότι  $f(x) > 0$ , για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .

**ε)** Κάθε συνάρτηση  $f$  που είναι συνεχής σε σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της είναι και παραγωγίσιμη στο  $x_0$ .

**Μονάδες 10**

**ΘΕΜΑ Β**

Δίνεται η συνάρτηση  $f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  με τύπο  $f(x) = \frac{1}{1 - \sqrt{x}}$

και η συνάρτηση  $g: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  με τύπο  $g(x) = \sqrt{x}$ .

**B1.** Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση  $f$  αντιστρέφεται και ότι η αντίστροφη της είναι η  $f^{-1}(x) = \left(\frac{x-1}{x}\right)^2$ ,  $x < 0$ .

**Μονάδες 9**

**B2.** Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση  $g \circ f^{-1}$  είναι η  $h(x) = \frac{x-1}{x}$ ,  $x < 0$ .

**Μονάδες 8**

**B3.** Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης  $h$  του ερωτήματος B2.

**Μονάδες 8**

**ΘΕΜΑ Γ**

Δίνεται η συνάρτηση  $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  με τύπο  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ .

**Γ1.** Να μελετηθεί η  $f$  ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

**Μονάδες 7**

**Γ2.** Να μελετηθεί η  $f$  ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.

**Μονάδες 7**

**Γ3.** Να βρεθεί το σύνολο τιμών της συνάρτησης  $f$ .

**Μονάδες 5**

**Γ4.** Να βρεθεί το πλήθος των ριζών της εξίσωσης  $f(x) = k$  για τις διάφορες πραγματικές τιμές του  $k$ .

**Μονάδες 6**

**ΘΕΜΑ Δ**

Δίνονται  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  με τύπους

$$f(x) = e^x, \quad g(x) = -x^2 - x.$$

**Δ1.** Να αποδείξετε ότι η μοναδική εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης  $f$  που διέρχεται από το σημείο  $M(-1, 0)$  είναι η ευθεία  $\varepsilon: y = x + 1$ .

**Μονάδες 9**

**Δ2.** Να αποδείξετε ότι η ευθεία ( $\epsilon$ ) του ερωτήματος Δ1 εφάπτεται και στη γραφική παράσταση της συνάρτησης  $g$ .

**Μονάδες 9**

**Δ3.** Να αποδείξετε ότι  $f(x) > g(x)$ , για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .

**Μονάδες 7**

**ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)**

- 1.** Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. **Να μην αντιγράψετε** τα θέματα στο τετράδιο και **να μη γράψετε** πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
- 2.** Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. **Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση.** Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
- 3.** Να απαντήσετε **στο τετράδιό σας** σε όλα τα θέματα **μόνο** με μπλε ή **μόνο** με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
- 4.** Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
- 5.** Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
- 6.** Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 17:00

**ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ**

**ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ**

## Θέμα Α

A1. Θεωρία σχολικό βιβλίο σελ. 133 Εφαρμογές το ΘΜΤ

A2. Θεωρία σχολικό βιβλίο σελ. 73 Ορισμός

A3. Θεωρία σχολικό βιβλίο σελ. 128.

A4. α) Λ β) Σ γ) Σ δ) Λ ε) Λ

## Θέμα Β

B1 Για οποιαδήποτε  $x_1, x_2 \in (1, +\infty)$  με  $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow \frac{1}{1-\sqrt{x_1}} = \frac{1}{1-\sqrt{x_2}} \Rightarrow$

$1-\sqrt{x_1} = 1-\sqrt{x_2} \Rightarrow -\sqrt{x_1} = -\sqrt{x_2} \Rightarrow \sqrt{x_1} = \sqrt{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2$  άρα η  $f$  είναι «1-1» και αντιστρέφεται.

Για να βρούμε την αντίστροφη της  $f$  θέτουμε  $y = f(x)$  και λύνουμε ως προς  $x$ . Έχουμε

λοιπόν:  $y = f(x) \Leftrightarrow y = \frac{1}{1-\sqrt{x}} \Leftrightarrow 1-\sqrt{x} = \frac{1}{y} \Leftrightarrow -\sqrt{x} = \frac{1}{y} - 1, \quad y < 0 \text{ ή } y > 1 \Leftrightarrow$

$\sqrt{x} = \frac{y-1}{y}, \quad y < 0 \text{ ή } y \geq 1 \Leftrightarrow x = \left(\frac{y-1}{y}\right)^2$  με  $y < 0 \text{ ή } y > 1$  και  $\left(\frac{y-1}{y}\right)^2 > 1$

Λύνοντας τους περιορισμούς του  $y$  έχουμε:

$\left(\frac{y-1}{y}\right)^2 > 1 \Leftrightarrow \frac{(y-1)^2}{y^2} > 1 \Leftrightarrow (y-1)^2 > y^2 \Leftrightarrow y < \frac{1}{2}$  και τελικά  $y < 0$ .

Οπότε η αντίστροφη της  $f$  είναι ή  $f^{-1}(x) = \left(\frac{x-1}{x}\right)^2, \quad x < 0$

B2. Θα πρέπει  $x \in D_{f^{-1}} \Rightarrow x < 0$  και  $f^{-1} \in D_g \Rightarrow f^{-1}(x) \geq 0 \Rightarrow \left(\frac{x-1}{x}\right)^2 \geq 0$  που ισχύει,

άρα  $D_{g \circ f^{-1}} = D_h = (-\infty, 0)$  και ορίζεται η  $g \circ f^{-1}$  με

$g \circ f^{-1}(x) = g(f^{-1}(x)) = \sqrt{\left(\frac{x-1}{x}\right)^2} = \left|\frac{x-1}{x}\right| = \frac{x-1}{x} = h(x)$

B3. Επειδή  $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-1}{x} = \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} (x-1)\right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}\right) = -1 \cdot (-\infty) = +\infty$  έχει

κατακόρυφη ασύμπτωτη την  $x = 0$

Επειδή  $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x} = 1$  έχει οριζόντια ασύμπτωτη την  $y=1$

## Θέμα Γ

Γ1. Η συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη ως πηλίκο παραγωγισίμων στο  $(0, +\infty)$  με

$$f'(x) = \frac{(\ln x)'x - \ln x \cdot (x)'}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

Έχουμε

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = 1 \Leftrightarrow x = e$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{1 - \ln x}{x^2} > 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x > 0 \Leftrightarrow 1 > \ln x \Leftrightarrow e > x$$

Επομένως για  $0 < x < e$ ,  $f'(x) > 0$  άρα η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $(0, e]$ ,

για  $x > e$ ,  $f'(x) < 0$  άρα η  $f$  είναι γνησίως φθίνουσα στο  $[e, +\infty)$ ,

και παρουσιάζει τοπικό μέγιστο (ολικό) για  $x=e$  το  $f(e) = \frac{1}{e}$

Γ2. Η  $f'$  είναι παραγωγίσιμη ως πράξεις παραγωγισίμων στο  $(0, +\infty)$  με

$$f''(x) = \frac{(1 - \ln x)'x^2 - (1 - \ln x)(x^2)'}{x^4} = \frac{-3 + 2 \ln x}{x^3}$$

Έχουμε:

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-3 + 2 \ln x}{x^3} = 0 \Leftrightarrow -3 + 2 \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = \frac{3}{2} \Leftrightarrow x = e^{\frac{3}{2}} \Leftrightarrow x = e\sqrt{e}$$

$$f''(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{-3 + 2 \ln x}{x^3} > 0 \Leftrightarrow -3 + 2 \ln x > 0 \Leftrightarrow \ln x > \frac{3}{2} \Leftrightarrow x > e^{\frac{3}{2}} \Leftrightarrow x > e\sqrt{e}$$

Επομένως

Για  $0 < x < e\sqrt{e}$ ,  $f''(x) < 0$  άρα η  $f$  είναι κοίλη στο  $(0, e\sqrt{e}]$

Για  $x > e\sqrt{e}$ ,  $f''(x) > 0$  άρα η  $f$  είναι κυρτή στο  $[e\sqrt{e}, +\infty)$  και παρουσιάζει σημείο

καμπής για  $x = e\sqrt{e}$  το  $\left( e\sqrt{e}, \frac{3}{2e\sqrt{e}} \right)$

Γ3 Αν  $\Delta_1 = (0, e]$  η  $f$  είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο  $\Delta_1$  και

$$A = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = \left( \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \right) \cdot \left( \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x \right) = (+\infty) \cdot (-\infty) = -\infty \text{ τότε}$$

$$f(\Delta_1) = (A, f(e)] = \left[ -\infty, \frac{1}{e} \right]$$

Αν  $\Delta_2 = [e, +\infty)$  η  $f$  είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο  $\Delta_2$  και

$$B = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \stackrel{DLH}{=} \left( \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \right) = 0 \quad \text{τότε } f(\Delta_2) = (B, f(e)] = \left( 0, \frac{1}{e} \right]$$

$$\text{Επομένως } R_f = f(\Delta_1) \cup f(\Delta_2) = \left( -\infty, \frac{1}{e} \right]$$

Γ4. Αν  $\kappa \leq 0$  τότε  $\kappa \in f(\Delta_1)$  άρα ή εξίσωση  $f(x) = \kappa$  έχει μοναδική λύση αφού η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $\Delta_1$ . Αν  $0 < \kappa < \frac{1}{e}$  τότε  $\kappa \in f(\Delta_1)$  και  $\kappa \in f(\Delta_2)$  άρα ή εξίσωση  $f(x) = \kappa$  έχει μοναδική λύση στο  $\Delta_1$  αφού η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $\Delta_1$  και μοναδική λύση στο  $\Delta_2$  αφού η  $f$  είναι γνησίως φθίνουσα στο  $\Delta_2$  άρα συνολικά έχει 2 λύσεις. Αν  $\kappa = \frac{1}{e}$  τότε η εξίσωση  $f(x) = \kappa$  έχει μοναδική λύση αφού για  $x=e$  η συνάρτηση έχει ολικό μέγιστο. Αν  $\kappa > \frac{1}{e}$  η εξίσωση είναι αδύνατη αφού  $\kappa \notin R_f$

## Θέμα Δ

A1. Θεωρώ  $A(x_0, f(x_0))$  σημείο επαφής της εφαπτομένης με την γραφική παράσταση της συνάρτησης  $f$ . Η  $f$  είναι παραγωγίσιμη με  $f'(x) = e^x$ . Άρα η εφαπτόμενη ( $\epsilon$ ) της γραφικής παράστασης της συνάρτησης  $f$  είναι ( $\epsilon$ ):  $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$   
αντικαθιστώντας έχουμε :  $y - e^{x_0} = e^{x_0}x - x_0e^{x_0} \Leftrightarrow y = e^{x_0}x - x_0e^{x_0} + e^{x_0}$

Εφόσον το  $M$  ανήκει στην ( $\epsilon$ ) την επαληθεύει άρα  $0 = -e^{x_0} - x_0e^{x_0} + e^{x_0} \Leftrightarrow x_0 = 0$   
μοναδική λύση. Άρα η γραφική παράσταση της  $f$  δέχεται μοναδική εφαπτόμενη που διέρχεται από το  $M$  και έχει εξίσωση  $y = x + 1$

Δ2. Αρκεί να δείξω ότι η εφαπτόμενη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης  $g$  που διέρχεται από το  $M$  είναι η  $y = x + 1$ .

Θεωρώ  $B(x_1, f(x_1))$  σημείο επαφής της εφαπτομένης με την γραφική παράσταση της συνάρτησης  $g$ . Η  $g$  είναι παραγωγίσιμη με  $g'(x) = -2x - 1$ . Άρα η εφαπτόμενη ( $\eta$ ) της γραφικής παράστασης της συνάρτησης  $g$  είναι ( $\eta$ ):  $y - g(x_1) = g'(x_1)(x - x_1)$   
αντικαθιστώντας έχουμε :

$$y + x_1^2 + x_1 = (-2x_1 - 1)x + 2x_1 + 1 \Leftrightarrow y = (-2x_1 - 1)x - x_1^2 + x_1 + 1$$

Εφόσον το  $M$  ανήκει στην ( $\eta$ ) την επαληθεύει άρα

$0 = 2x_1 + 1 - x_1^2 + x_1 + 1 \Leftrightarrow x_1^2 + 3x_1 + 2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -1$  ή  $x_1 = -2$ . Άρα η γραφική παράσταση της  $f$  δέχεται δύο εφαπτόμενες που διέρχονται από το  $M$ . Για  $x = -1$  έχουμε

( $\eta$ )  $y = x + 1$ . Άρα η ευθεία ( $\epsilon$ ) του ερωτήματος Δ1 εφάπτεται και στην γραφική παράσταση της συνάρτησης  $g$ .

Δ3. Η συνάρτηση  $f$  είναι δύο φορές παραγωγίσιμη με  $f''(x) = e^x > 0$  για κάθε  $x \in \mathfrak{R}$   
επομένως είναι κυρτή στο  $\mathfrak{R}$  επομένως  $f(x) \geq x+1$  και η ισότητα ισχύει για  $x=0$

Η συνάρτηση  $g$  είναι δύο φορές παραγωγίσιμη με  $g''(x) = -2 < 0$  για κάθε  $x \in \mathfrak{R}$   
επομένως είναι κοίλη στο  $\mathfrak{R}$  επομένως  $g(x) \leq x+1$  και η ισότητα ισχύει για  $x=-1$

Επομένως  $f(x) > x+1 > g(x)$  αφού οι ισότητες ισχύουν για διαφορετικά  $x$ . Τελικά  
 $f(x) > g(x)$  για κάθε  $x \in \mathfrak{R}$ .